

診療科: 肝胆膵内科 原三信病院 がん化学療法プロトコール一覧
 がん腫: 膵・胆管・肝がん

2024年12月1日現在

プロトコール名	抗がん剤 (一般名)	投与量	投与時間	投与日	1コース 期間	支持療法(一般名) 1日量 ※副作用に対する薬剤です	備考	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8・15	28日間	d1 ラモセトロンOD錠0.1mg	※生食希釈板、ブドウ糖希釈板あり	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分点滴	d1	14日間	d1 ジフェンヒドラミン錠50mg		
	レボホリナート	200mg/m ²	120分点滴	d1		d1 ファモチジンOD錠20mg		
	イリノテカン	180mg/m ²	90分点滴	d1		d1-4 デキサメサゾン錠8mg		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分点滴	d1		d1-3 アブレピタント錠[d1:125mg d2・3:80mg]		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間点滴	d1-2				
アブラキサン+GEM	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	30分点滴	d1・8・15	28日間	d1 パロノセトロン注0.75mg		
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8・15		d1 デキサメサゾン注6.6mg		
						d2・3 d9・10 d16・17		デキサメサゾン錠8mg
TS-1+GEM(4週1クール)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25m ² 未満 →80mg/day 1.25m ² ~1.5m ² 未満 →100mg/day 1.5m ² 以上 →120mg/day	1日2回朝・夕食後	d1夕-15朝投薬 d15夕-29朝休業	28日間	d1・15	ラモセトロンOD錠0.1mg	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・d15				
TS-1+GEM(3週1クール)	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25m ² 未満 →60~80mg/day 1.25m ² ~1.5m ² 未満 →100mg/day 1.5m ² 以上 →120mg/day	1日2回朝・夕食後	d1夕-15朝投薬 d15夕-22朝休業	21日間	d1・8	ラモセトロンOD錠0.1mg	※最低投与量は添付文書80mg/日 だが1.25m ² 未満は60mg/日(朝 40mg、夕20mg)で投与可
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8				
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	d1・8	21日間	d1・8 グラニセトロン注3mg		
						d1・8 デキサメサゾン錠4mg		
	d1・8 マンニトール注20% 300mL							
	d1-3 アブレピタント錠[d1:125mg d2・3:80mg]							
シスプラチン	25mg/m ²	120分点滴	d1・8	d8-10 アブレピタント錠[d8:125mg d9・10:80mg]				
イミフィンジ(胆道) GEM+CDDP併用	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	d1	21日間			
イミフィンジ(胆道)単独	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	d1	28日間			
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	初回60分 2回目以降30分点滴	d1	14日間	d1 ジフェンヒドラミン錠50mg		